



Article de Jean Michel AVENEL
Responsable
Commission Technique Becs Crochus



LA PERRUCHE TURQUOISINE

Nom Latin : (Neophema . Pulchella
Famille : des Psittacidés

C'est une perruche très populaire, espèce idéale pour les éleveurs débutant, ou pour les particuliers, oiseau résistant en volière extérieure, toutefois on peut la faire vivre en cage de taille assez grande ou en volière d'appartement.
Elevée seule, elle s'apprivoise rapidement.

LA TURQUOISINE A L'ETAT SAUVAGE . (habitat et mœurs)

La perruche turquoisine vit dans le sud est de l'australie, elle fréquente les forêts et les prairies boisées, les versants montagneux.

Elle est généralement sédentaire, on l'observe souvent en couple, ou en petit groupe.

Aux moments les plus chauds de la journée, elle se tient à l'ombre dans les buissons et les arbres.

Le reste du temps elle le passe au sol à la recherche de nourriture : mouron blanc, orties, chardon, graminées.

Elle vient boire dans les cours d'eau, au lever du jour et avant la tombée de la nuit.

La période de reproduction commence en août pour finir en décembre, elle niche dans un trou de souche à ras du sol ou dans un tronc d'arbre.

Elle pond entre quatre et cinq œufs dans du bois vermoulu. La durée d'incubation est de dix huit à vingt jours.

Seule la femelle couve, puis les deux parents nourrissent les oisillons pendant un mois.

Les jeunes quittent le nid à quatre semaines.

Ils acquièrent leur plumage d'adulte vers l'âge de quatre à cinq mois.

Le mâle est vert avec le ventre jaune, la tête est bleu et les joues sont plus pâles.

Les ailes ont une barre rouge (grenat), les petites et moyennes couvertures alaires sont bleu turquoise, la bordure des grandes rémiges et des grandes couvertures sont bleu foncé.

La queue est verte, et les rectrices latérales sont de jaune.

Les pattes sont grises, les yeux bruns, et le bec est gris foncé.

Petite remarque importante la bande sous- alaire est absente chez le mâle.

La femelle a la poitrine verte, et les zones bleues de la tête sont plus claires moins étendues que chez le mâle, elle n'a pas de barre rouge sur les ailes, contrairement au mâle elle possède une bande sous alaire.

HABITAT ET MOEURS EN CAPTIVITE

Hébergement : l'idéal est d'avoir une volière assez grande pour recevoir un couple de turquoisine, je connais des éleveurs qui font reproduire en batterie, je pense personnellement et cela n'engage, que moi, que c'est un moyen de (dépannage pour la reproduction et rien d'autre) il existe des oiseaux plus calmes pour ce type d'élevage.

Ayant un vol rapide la turquoisine demande une volière avec un couloir de deux mètres ou

plus, ça ne peut nuire à votre élevage et surtout au confort de l'oiseau.

Sa beauté n'en ressortira que mieux, attention toutefois aux accidents suite à un choc, il me vient à l'esprit le traumatisme crânien, il faudra peut être garnir le fond de votre couloir avec des branchages.

Nous trouvons dans certain élevage au moment de la reproduction, un filet au bout de l'espace de vol, pour éviter aux jeunes de se blesser.

Mœurs en captivité :

La turquoisine est probablement l'euphème la plus prisée des éleveurs, je pense que la diversification de ses mutations en n'est peut être une des raisons principale.

Elle accepte la cohabitation avec les autres euphèmes, attention toutefois à ne pas mettre deux couples de turquoisine ensemble durant la reproduction, il sera préférable d'introduire un couple de bourke ou d'élégante.

Elle adore l'eau, il est donc indispensable de prévoir de l'eau propre dans les baignoires, et le nettoyage journalier des abreuvoirs.

Alimentation : concernant les graines, un bon mélange pour les euphèmes sera le bien venu, ainsi qu'une pâtée de bonne qualité, et des graines germées durant la reproduction, sans oublier la verdure, les fruits et les baies.

Le nichoir : un nid en bois de 20cm sur 20cm au carré et 40cm de haut avec un trou d'envol de 6cm de diamètre, garnis de copeaux de bois et d'une poignée de tourbe blonde humide devrait convenir à la femelle.

En captivité la mise en place du nid se fait généralement au mois de mars, la période de reproduction se termine vers le mois d'août.

La femelle pond de 4 à 5 œufs et parfois plus, elle couve dès la ponte du troisième œuf, la durée de couvaison est la même qu'à l'état sauvage.
